

草铵膦可以防治哪些杂草呢？

草铵膦为灭生性、触杀型(有部分内吸作用)、苗后茎叶处理剂。由杂草茎叶吸收。药剂被杂草吸收后，短时间内杂草体内的氨代谢便陷于混乱，细胞毒剂铵离子在杂草体内累积，与此同时，光合作用被严重抑制。适用于蔬菜、果园(如柑橘园、木瓜园、香蕉园)、茶园、橡胶园、空地(非耕地)等，防除多种一年生、多年生杂草。

草铵膦怎样使用？

草铵膦又名草丁膦。杀草原理与双丙氨膦相似，只宜做苗后茎叶喷雾，对种子和未出土的幼芽无效。是灭生性除草剂，适用于果园、橡胶园、棕榈园、观赏性灌木、森林、非耕地及免耕农田防除一年生和多年生禾本科杂草，如看麦娘、马唐、稗草、早熟禾、狗尾草、野燕麦、狗牙根、匍匐冰草、剪股颖、芦苇、羊茅等；对藜、蓼、苋、芥菜、龙葵、繁缕、猪殃殃、苦苣菜、田蓟、田旋花、蒲公英等阔叶杂草亦有一定效果。一般是在杂草生长旺盛始期及禾本科杂草分蘖始期，亩用有效成分50~80克，对水喷洒茎叶，持效期30~45天。